

○伊豆淨蓮瀧附近ノ羊齒類目録 (原田利一)

じょうれんしだ (*Woodwardia unigemmata* Nakai) 及みぞしだもどき (*Glaphyopteris omeiensis* H. Ito) 等ノ自生地トシテ知ラルル淨蓮瀧ヲ圍ム低山群ハ、羊齒類ノ生育旺盛ニシテ、種類モ、こばのいしかぐま (*Denmstaedtia scarba* Moore), しらん (*Vittaria flexuosa* Fée), いはやしだ (*Diplazopsis javanica* C. Christensen), ほらごけ (*Vandenboschia radicans* Copeland), こしだ (*Dicranopteris dichotoma* Bernhardt) 等南方分子アリ、をしだ (*Dryopteris crassirhizoma* Nakai), ひめしだ (*Thelypteris palustris* Schott), ながほのなつのはなわらび (*Botrychium strictum* Underwood) 等北方分子アリ、更ニ又、うすひめわらび (*Acystopteris japonica* Nakai), あをねかづら (*Marginaria niponica* Nakai), きじのをしだ (*Plagiogyria japonica* Nakai) 等日本特有分子モ混エ、總數 100 餘種ニ及ビ、我ガ國 (北海道、本州、四國、九州及夫等ノ屬島) ニ生育スル羊齒類總數ノ約 1/3 ヲ算ス。

余ハ、昭和 11 年以來數度コノ地ニ採集セシガ、今回 (昭和 21 年) 又々訪レタルニ、終戦後ノ森林濫伐ノタメ、むらさきべにしだ (*Dryopteris erythrosora* O. Kuntze var. *purpurascens* H. Ito), いぬいはへご (*Dryopteris cycadina* C. Christensen var. *typica* Nakai) 等ノ稀品ノ枯死絶滅シツ、アルヲ目撃シ、早急ニ現在マデ蒐集シ得タル種類ノ表ヲ作成セシ次第ナリ。

ソノ採集地ハ、東ハ下田街道、西ハ松崎街道 (猫越街道) ヲ界トシ、南ハ猫越部落ト茅野部落ヲ連絡スル林道 (營林署ノ桐山徑路ト稱スルモノニシテ桐山峠ヲ通過) ニ至リ北ハ下田街道ト松崎街道ノ合一スル地點 (概ネ市山部落附近) マデトシ、面積約 8 平方 km ニシテ、附近住民ノイハユル、望樓 (約 440m), 向ノ平 (約 560m) ノ低山群ヲ主トシ、狩野川及夫ノ上流ナル本谷川、猫越川コノ地ヲ貫流ス。

Ophioglossaceae はなやすり科

Botrychium japonicum Underwood (おほはなわらび), **B. strictum** Underwood (ながほのなつのはなわらび), **B. ternatum** Swartz (ふゆのはなわらび)。

Hymenophyllaceae こけしのぶ科

Conocormus minutus v. d. Bosch (うちほごけ), **Crepidomanes latealatum** Copeland (あをほらごけ), **Hymenophyllum barbatum** Baker (かうやこけしのぶ), **Mecodium polyanthos** Copeland (ほそばこけしのぶ), **Vandenboschia radicans** Copeland (ほらごけ)。

Plagiogyriaceae きじのをしだ科

Plagiogyria euphlebia Mettenius (おほきじのを), **P. japonica** Nakai (きじのを)。

Polypodiaceae うらぼし科

Acystopteris japonica Nakai (うすひめわらび), *Adiantum monochlamys* Eaton (はこねしだ), *Antrophyum obovatum* Baker (たきみしだ), *Asplenium anceps* v. d. Bosch var. *proliferum* Nakai (いぬちやせんしだ), *A. incisum* Thunberg (とらのをしだ), *A. Sarelil* Hooker (こばのひのきしだ), *Athyrium iseanum* Rosenstock (ほそばいぬわらび), *A. niponicum* Hance (いぬわらび), *A. otophorum* Koidzumi (たにいぬわらび), *A. pycnosorum* Christ (はくまうるのて), *A. unifurcatum* C. Christensen var. *Okuboanum* H. Ito (おほひめわらび), *A. Vidalii* Nakai (やまいぬわらび), *A. Wardii* Makino (ひろはいぬわらび), *A. yokoscense* Christ (へびのねごぞ), *Coniogramme fraxinea* Diels (いはがねぜんまい), *Cornopteris decurrenti-alata* Nakai (しけちしだ), *Ctenitis Maximowicziana* Ching (きよすみひめわらび), *Cyclosorus acuminatus* Nakai (ほしだ), *Cyrtomium clivicolum* Tagawa (やまやぶそてつ), *C. Fortunei* J. Smith (やぶそてつ), *C. macrophyllum* Tagawa (ひろはやぶそてつ), *Davallia Mariesii* Moore (しのぶ), *Dennstaedtia hirsuta* Mettenius (いぬしだ), *D. scabra* Moore (こばのいしかぐま), *Diplazopsis javanica* C. Christensen (いなやしだ), *Diplazium dimorphophyllum* Koidzum (ぜいたかしけしだ), *D. grammitoides* Presl (ほそばしけしだ), *D. hachijoense* Nakai (しろやましだ), *D. lanceum* Presl (へらしだ), *D. Naganumanum* Makino (ひかげわらび), *D. oshimense* H. Ito (しけしだ), *D. squamigerum* Matsumura (きよたきしだ), *D. Wichurae* Diels (のこぎりしだ), *Dryopteris Bissetiana* C. Christensen var. *sacrosancta* H. Ito (ひめいたちしだ), var. *typica* H. Ito (おほいたちしだ), *D. crassirizoma* Nakai (をしだ), *D. cycadina* C. Christensen var. *melanolepis* Nakai (いはへご), var. *typica* H. Ito (いぬいはへご), *D. erythrosora* O. Kuntze (べにしだ), var. *purpurascens* H. Ito (むらさきべにしだ), *D. fuscipes* C. Christensen (まるばべにしだ), *D. hondoensis* Koidzumi (おほべにしだ), *D. lacera* O. Kuntze (くまわらび), *D. Sabaei* C. Christensen (みやまいたちしだ), *D. uniformis* Makino (をくまわらび), *D. varia* O. Kuntze (いたちしだ), *Glaphyropsis falciloba* H. Ito (いぶきしだ), *G. omeiensis* H. Ito (みぞしだもどき), *Lemmaphyllum microphyllum* Presl (まめづた), *Lepisorus Onoei* Ching (ひめのきしのぶ), *L. Thunbergianus* Ching (のきしのぶ), *Leptogramma totta* J. Smith (みぞしだ), *Loxogramme Fauriei* Copeland (さじらん), *L. salicifolia* Makino (いはやなぎしだ), *Maricaria niponica* Nakai (あさねかづら), *Microlepis marginata* C. Christensen (ふもとしだ), *Microsorium ensatum* H. Ito (くりはらん), *M. sub-hastatum* Ching (やのねしだ), *Neoniphopsis linearifolia* Nakai (びろうどしだ), *Notogramme japonica* Presl (いはがねさう), *Onychium japonicum* Kunze

(たちしのぶ), *Pentarhizidium japonicum* Hayata (いぬがんそく), *Phegopteris* decursive-pinnata Fée (げじげじした), *Phymatopsis hastata* Kitagawa (みつでうらばし), *Polystichum craspedosorum* Diels (つるでんだ), *P. japonicum* Diels (ゐので), *P. Makinoi* Tagawa (かたゐので), *P. polyblepharum* Presl (ひめかなわらび), *P. retroso-paleaceum* Tagawa var. *ovato-paleaceum* Tagawa (つやなしゐので), *P. tripterum* Presl (じふもんじした), *Pteridium aquilinum* Kuhn var. *japonicum* Nakai (わらび), *Pteris cretica* Linnaeus (おほばのゐのもとさう), *P. dispar* Kunze (あまくさした), *P. inaequalis* Baker var. *aequata* Tagawa (おほばのはちぢやうした), var. *simplicior* Tagawa (おほばのあまくさした), *P. multifida* Poiret (ゐのもとさう), *Pyrrosia hastata* Ching (いはおもだか), *Rumohra amabilis* Ching (おほかなわらび), *R. aristata* Ching var. *pseudoaristata* H. Ito (こばのかなわらび), var. *typica* H. Ito (ほそばかなわらび), *R. simplicior* Ching var. *major* H. Ito (おにかなわらび), var. *typica* H. Ito (はかたした), *R. Standishii* Ching (りやうめんした), *Spcantopsis nipponica* Nakai var. *japonica* Nakai (ししがしら), *Stenoloma chusanum* Ching (ほらしのぶ), *Taraxia Wilfordii* H. Ito (あながねした), *Thelypteris glanduigera* Ching var. *typica* H. Ito (はしごした), *T. japonica* Ching (はりかねわらび), *T. laxa* Ching (やはらした), *T. oligophlebia* Ching var. *elegans* Ching (ひめわらび), *T. palustris* Schott (ひめした), *Vittaria flexuosa* Fée (ししらん), *Woodwardia orientalis* Swartz (こもちした), *W. unigemmata* Nakai (じようれんした)。

Gleicheniaceae うらじろ科

Dicranopteris dichotoma Bernhardi (こした), *D. glauca* Nakai (うらじろ)。

Lygodiaceae かにくさ科

Lygodium japonicum Swartz (かにくさ)。

Osmundaceae ぜんまい科

Osmunda japonica Thunberg (ぜんまい)。

〇しやしやんぼノ方言わくらニ就テ (前川文夫)

わくら又へわくらばトイヒ私ノ郷里ノ三重縣中部デモ同様デアル。コレハ病葉ノ意味デ、ユカシイ古語ガ殘ツタモノト考ヘラレルガ、ドコガ病葉ヲ聯想サセルノカトイフニ、牧野先主ハ紅色ノ嫩葉ガ舊葉ト混ジテ居ル際ニコレヲ病葉ニ見立テタモノト云ハレテ居ル。本種ハ常緑樹デアルガ、葉ガ古クナルト(殊ニ年ヲ越スト)褐色乃至縹紫色デ、シカモ白味ヲ混ヘタ様ニ見エルトコロノ病斑様ノ膚色ガ表面ニアラハレテ來ル。ソレガ中々著シイ株ガアル。寧ロコノ事ガわくらノ名ガ附イタモトデハナカロウカ。